

EFERCLOR

Higienizante clorado universal




Produto em forma de comprimidos de tipo efervescente que em contacto com a água libera cloro activo. Ideal para a higienização de todo tipo de superfícies, com um poder grande germicida frente a um número grande de micro-organismos. Sua apresentação em forma de comprimidos-dose efervescentes lhe confere as seguintes vantagens: Dosificação fácil. Armazenamento reducido. Segurança na utilização. Fácil de usar. Estabilidade da concentração de cloro. Dissolve-se rápidamente. Um comprimido dissolvido em 10 litros de água proporciona uma concentração de 150 ppm (partes por milhão) de cloro activo, suficientes para obter uma higienização geral. Apto para a indústria alimentícia.

EFERCLOR, cumpre com a seguinte norma:

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas e Fungicidas em superfícies, para uso ambiental. NORMA UNE-EN 14476 na concentração de 3 comprimidos por 10 litros de água, com 5 minutos de contato e a uma temperatura de 20°C, como viricida

APRESENTAÇÃO



Recipientes de 1 Kg.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	N.A.
Cor:	N.A.
Densidade:	N.A.
pH:	6,5 (1%)



Tª Inflamação:	N.A.
Viscosidade (cPs, 20°C):	N.A.
Carência Química de Oxigénio (CQO):	N.A.
Teor de Fósforo (P):	N.A.
Outros:	N.A.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

Dicloroisocianurato de sódio di-hidratado 84%
Excipientes csp 100%

EFERCLOR

Higienizante clorado universal



DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de usar o produto, ler atentamente a etiqueta com a finalidade de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente. Adequado para o tratamento de frutas e legumes. Dissolver de 1 a 3 comprimidos por cada 10 litros de água preferentemente morna. Esta dose pode ser aumentada pois cada comprimido solta 1'5 gr de cloro activo. Pode-se utilizar para lavagem normal, pulverização, imersão, circulação ou de forma habitual com esfregona. Não deverá ser misturado com nenhum outro produto químico (pode soltar gases perigosos-cloro). Incompatível com álcalis, ácidos, agentes oxidantes e redutores, produtos nitrogenados, sais amónicas, urea, aminas. Os recipientes vazios devem ser geridos de acordo com as suas características de risco e de acordo com as regulamentações através de recicladores locais

RECOMENDAÇÕES PARA CASOS DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE

A INTOXICAÇÃO PODE PRODUZIR:

De irritação a corrosão de olhos, pele, mucosas, aparelho respiratório e gastrointestinal. disfagia, sialorreia e vômitos. Edema de glote, pneumonite, broncoespasmo, edema pulmonar e pneumonia por aspiração.

PRIMEIROS AUXÍLIOS:

Afastar a pessoa da zona contaminada. retirar imediatamente a roupa com nódoas ou salpicos. lave os olhos com abundante água pelo menos durante 15 minutos. Não esqueça de retirar as lentes de contacto. Lave a pele com abundante água e sabão, sem esfregar. Em caso de ingestão, não provoque o vômito. Mantenha o paciente em repouso. Conserve a temperatura corporal. Controle a respiração. Se fosse necessário, aplicar respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente, estendê-la de lado com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e os joelhos semi-flexionados. Levar a pessoa intoxicada para um centro hospitalário e, sempre que seja possível, leve a etiqueta ou o recipiente do produto. Não deixe nunca a pessoa intoxicada só.

CONSELHOS TERAPÊUTICOS:

Em caso de ingestão, não é aconselhável esvaziado gástrico, avaliar a realização de endoscopia. Não neutralizar com ácidos ou bases. a diluição com água ou leite é apropriada se não ocasionou-se o vômito (adultos de 120-240 mL crianças não ultrapassar de 120 mL).

Tratamento sintomático

Características Microbiológicas:

Abaixo resumimos o resultado do teste de eficácia realizado pelo Instituto Pasteur de Lyon, de acordo com o qual é suficiente uma concentração de 50 ppm (partes por milhão) de cloro activo para controlar a proliferação dos microorganismos utilizados no teste.

ORIGINES BACTERIANOS	CONCENTRÇÃO DO PRODUTO EN PPM					
	75	50	25	10	5	1
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	-	-	+	+	+	+
<i>Escherichia coli</i>	-	-	-	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	-	-	-	+	+	+
<i>Enterococcus faecium</i>	-	-	+	+	+	+
<i>Mycobacterium smegmatis</i>	-	-	+	+	+	+

Significado:

(+) mais de 150 colónias por caixa = insuficiente poder germicida

(-) menos de 150 colónias por caixa = se tem poder germicida

Em caso de ingestão accidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143 N°FAB 63.393

Ed: AA/24

20/05/2024